LIFE 18 NAT/FR/000906

LIFE
ANTHROPOFENS

Coordonné par le
Conservatoire d'espaces naturels
des Hauts-de-France

DES HABITATS À RESTAURER

Une tourbière n'est pas un milieu uniforme : elle se compose d'une **mosaïque d'habitats naturels** aux caractéristiques propres

1 TOURBIÈRES DE TRANSITION ET TREMBLANTS

Cet **habitat pionnier** que l'on retrouve dans les zones les plus humides ou en bordure d'étang est composé de plantes constituant un radeau flottant (tremblant) plus ou moins en contact avec le fond du plan d'eau. Les principales plantes caractéristiques sont la **Laîche en ampoule** (*Carex rostrata*), la **Laîche filiforme** (*Carex lasiocarpa*), le **Trèfle d'eau** (*Menyanthes trifoliata*) et la **Potentille des marais** (*Comarum palustre*).

Laîche en ampoule

Trèfle d'eau

Potentille des marais



2 MARAIS CALCAIRE À MARISQUE

Caractérisé par sa densité, cet habitat se présente sous forme de nappes denses de Marisque (*Cladium mariscus*) oscillant autour d'1,5 m de hauteur. Le **Marisque** possède une forte capacité de colonisation par voie végétative. Malgré son caractère uniforme, cet habitat présente de forts enjeux pour la faune, dont la ***Dolomedes plantarius*** ou la **Locustelle luscinoïde**.

Marisque

Doloméde

Locustelle luscinoïde

3 TOURBIÈRES BASSES ALCALINES

Partie de la tourbière où le sol est constamment gorgé d'eau et où la tourbe peut se former. Le cortège de plantes comprend les **espèces les plus menacées** présentes en tourbière. Les principales espèces sont le **Jonc subnoduleux** (*Juncus subnodulosus*), le **Choin noirâtre** (*Schoenus nigricans*) et beaucoup de petites laîches comme la **Laîche écailleuse** (*Carex lepidocarpa*), ou des mousses rares comme la **Scorpidie verdâtre** (*Scorpidium cossoni*).

Choin noirâtre

Laîche écailleuse

Scorpidie verdâtre

Crédits photos : D. Sellier & C. Dumont, A. Mercatoris & F. Gillet, P. Tack, M. Hermant, J. Lemaire, J. Lemaire, CEN Haute-de-France